

PADOVA

Ponte di Brenta - Via Bravi, 49

Direttore Sanitario Dott. Andrea Luigi Fabrello

VENEZIA

Mira - Via Bologna, 5/A

Direttore Sanitario Dott.ssa Susanna Pavanello

**DIAGNOSTICA
R I V I E R A**

PRENOTAZIONI E INFORMAZIONI RAPIDE

www.diagnosticariviera.it

mira@pavanellogroup.it

Ponte di Brenta (PD) - Tel. 049 6225200

Mira (VE) - Tel. 041 424700

COPIA USA E GETTA

Una volta presa e letta,
non riparla nel dispenser.
Vi preghiamo di portarla con
voi oppure buttarla. Grazie

**DIAGNOSTICA
R I V I E R A**



**UROLOGIA
PEDIATRICA**

LA SALUTE È IL NOSTRO OBIETTIVO

UROLOGIA PEDIATRICA

La competenza minzionale (fare bene la pipì al momento giusto, nel modo giusto, nel posto giusto) si acquisisce nell'arco di 5 anni passando attraverso tappe progressive.

Da una minzione riflessa del neonato, senza cioè capacità di controllo volontario, si arriva alla capacità di accorgersi che scappa la pipì e che è possibile trattenerla volontariamente fino a che non ci si trovi in una situazione socialmente adeguata per farla.

Questo avviene attraverso una lenta acquisizione di competenze inibitorie che permettono di dilazionare la minzione riflessa primitiva di origine sacrale.

Talvolta in molti bambini questo percorso si inceppa e porta a forme di incontinenza urinaria durante il giorno che vanno dalle semplici mutandine "inumidite" (damp pants) fino ad una vera e propria perdita di una intera pipì).

Talvolta i bambini per non arrivare a perdere la pipì mettono in atto una serie di manovre, dai saltelli all'accovacciamento.

Spesso i familiari interpretano questi comportamenti come "pigrizia" quando invece sono fenomeni legati ad una funzione iperattiva del loro muscolo vescicale.

Questo malfunzionamento della vescica interessa oltre il 15% dei bambini di 4-5 anni ed il 5% di quelli di 9-10 anni.

Inoltre più di 1.000.000 di bambini tra i 6-14 anni continua a bagnare il letto durante la notte con grave impatto sul loro grado di autostima ed immagine corporea, nonché sulla crescita nelle autonomie sociali fortemente compromesse dalla presenza del loro problema notturno.

Spesso questo malfunzionamento del muscolo vescicale è anche causa delle infezioni urinarie recidivanti delle basse vie urinarie (cistiti) presenti soprattutto nelle bambine in età scolare.



Lo studio di questi problemi disfunzionali, accanto a quelli delle malformazioni congenite, sono stati oggetto di studio di una area specialistica dell'urologia dedicata proprio ai bambini nota come Urologia Pediatrica. Soprattutto negli ultimi 40 anni molte conoscenze scientifiche sono state acquisite sia sul versante diagnostico che terapeutico, riabilitativo e prognostico dimostrando come ben l'80% degli adulti con incontinenza urinaria erano stati bambini /e con i problemi sopra descritti.

Comprendere e trattare questi problemi è oggi possibile in maniera assolutamente non invasiva attraverso un'accurata e ben strutturata anamnesi minzionale, la compilazione del diario minzionale e l'esecuzione di diagnostiche di primo livello come l'esame delle urine, l'urinocoltura, un'ecografia renale e vescicale parametrica.

I dati ricavati permetteranno di quantificare la portata del problema ed iniziare una terapia risolutiva adeguata.

La **Dott.ssa Chiozza Maria Laura**, specialista in Urologia Pediatrica, si occupa presso la nostra struttura di inquadrare e trattare adeguatamente questi problemi in età pediatrica ed adolescenziale.

